

Форма выпуска: Таблетки.

Действующий компонент: Сультиам - 50 мг или 200 мг.

Упаковка: 50 шт.

Срок годности: Осполот 50 - 02/2025, Осполот 200 - 04/2025.

Описание: Круглые таблетки белого цвета. На одной поверхности – насечка «50» или «20», на второй – риска.

Показания: Осполот® - препарат из группы сульфаниламидов, применяемый для лечения определенной формы эпилепсии. Назначается при сложных роландической эпилепсии, височной эпилепсии, синдроме Ландау-Клеффнера, синдроме псевдо-Леннокса, ESES.

Состав:
1 таблетка Осполот® 50 включает 50 мг сультиама, 1 таблетка Осполот® 200 включает 200 мг сультиама.

Остальные ингредиенты: желатин, гидромеллоза, моногидрат лактозы, макрогол 4000, стеарат магния, кукурузный крахмал, высокодисперсный диоксид кремния, тальк, диоксид титана.

Дозировка и применение:
Терапию, а также изменения в дозировке назначает только врач. Данная инструкция не заменяет консультацию специалиста. Обычная лечебная доза равняется 5 - 10 мг на килограмм массы тела в сутки. Выход за эффективную дозу, переход с другого медикамента на Осполот осуществляется постепенно.

Таблетки нужно принимать целиком, запивая большим количеством воды, во время или вне еды. Суточная доза обычно делится на 3 приема. Рекомендуется принимать лекарство в одно и то же время каждый день.

Если вы забыли принять Осполот, не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную. Пожалуйста, примите дозу, предписанную доктором, в следующее запланированное время. О всех пропусках следует сообщать лечащему врачу.

Противопоказания

- Аллергия на Сультиам или другие вещества, входящие в состав.
- Гипертиреоз.
- Высокое кровяное давление.
- Заболевания крови.
- Заболевания почек и печени.
- Психические расстройства.
- Тяжелые расстройства дыхания.
- Беременность и лактация.
- Перед началом лечения рекомендуется сдать общий анализ крови, функциональные пробы печени и почек.

Побочные реакции

Очень частые (затрагивают больше 1 пациента из 10):

- Дискомфорт ЖКТ (например, тошнота, рвота).
- Сонливость или бессонница.
-

Частые (1-10 пациентов из 100):

- Затрудненное дыхание, вплоть до одышки (зависит от дозы).
- Чувство давления в груди, повышенное сердцебиение.
- Покалывание конечностей или лица (зависит от дозы).
- Головокружение, головная боль.
- Икота, потеря веса или ухудшение аппетита.
- Нервозность, эмоциональность.
-

Редкие (от 1 до 10 пациентов из 1000):

- Галлюцинации, беспокойство, апатия.
- Мышечная слабость, суставные боли.
- Усиление припадков, статус grand mal.
-

У отдельных пациентов:

- Гиперчувствительность с лихорадкой, кожной сыпью, воспалением сосудов, опухолью лимфатических узлов, суставной болью, изменением количества лейкоцитов и увеличением печени или селезенки.
- Острая почечная недостаточность.
- Значительное ухудшение зрения.
- Депрессия, изменения личности и суицидальные мысли.

Взаимодействие с другими медикаментами:

Расскажите лечащему врачу, какие еще препараты вы пьете, недавно пили или собираетесь принимать.

Сочетание с лекарствами для лечения эпилепсии:

- Фенитоин: уровень фенитоина в крови может значительно повыситься. Эта комбинация требует тщательного наблюдения, особенно при нарушении функции почек.
- Ламотриджин: в единичных случаях может повышаться уровень ламотриджина в крови. Поэтому уровень ламотриджина в крови следует проверять чаще в начале такого комбинированного лечения.
- Примидон: побочные эффекты Осполота могут усиливаться. В частности, это может привести к неустойчивости, головокружению и сонливости.
- Карбамазепин: в отдельных случаях уровень Сультиама в крови уменьшался при совместном приеме карбамазепина.

Совместное применение Сультиама и других ингибиторов карбоангидразы (например, топирамата для лечения эпилепсии и мигрени или ацетазоламида для лечения повышенного внутриглазного давления) может увеличить риск побочных реакций от ингибирования карбоангидразы.

Особые рекомендации

Если во время лечения препаратом развиваются лихорадочное состояние, боль в горле, кожная аллергия с отеком лимфатических узлов и/или симптомы гриппа, немедленно сообщите доктору.

Прием Осполота 50 мг вместе с алкоголем

Во время приема препарата нельзя употреблять алкоголь, поскольку он может изменить и усилить действие лекарства непредвиденным образом.

Более того, Осполот в сочетании с алкоголем может вызвать неприятные реакции, связанные с расширением сосудов, пульсирующей головной болью, одышкой, тошнотой, учащенным сердцебиением, падением артериального давления, нечеткостью зрения, спутанностью сознания, сердечными аритмиями, потерей сознания и судорогами.

Период беременности и кормления грудью

Проконсультируйтесь с врачом, если вы планируете беременность, беременны или кормите грудью. Лекарство не назначается во время беременности, за исключением особых случаев.

Не прерывайте лечение Осполотом без предварительной консультации с врачом. Внезапное прекращение лечения или неконтролируемое снижение дозы может вызвать повторение эпилептических припадков, которые могут навредить вам и будущему ребенку.

Женщинам следует использовать эффективные средства контрацепции во время терапии и один месяц после её окончания.

Осполот может выходить с грудным молоком. Поэтому в этот период стоит отказаться либо от грудного вскармливания, либо от лечения Сультиамом.

Влияние на управление автомобилем и механизмами

Препарат может изменять скорость реакции, поэтому управлять автомобилем или сложными механизмами не рекомендуется.

Содержит лактозу

Лекарство имеет в составе лактозу. Проконсультируйтесь с доктором при непереносимости.

Хранение

Срок хранения – 3 года. Не употреблять препарат с истекшим сроком. Держать в сухом месте при комнатной температуре, избегая прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

Производство

DESITIN Arzneimittel GmbH
Weg beim Jäger 214
22335 Hamburg

Список литературы:

Официальная инструкция производителя DESITIN.

